

SIL – ZBIORCZY DLA ZIOŁOWA TRADYCJA (8 SKU) DLA FARMACEUTY/LEKARZA

- 1. SYROP PRAWOŚLAZOWY, 35,9 g/100 g, syrop. Skład:** 100 g syropu zawiera 35,9 g maceratu z korzenia prawoślazu (*Althaea officinalis L., radix*) (co odpowiada 5 g korzenia prawoślazu); ekstrahent: mieszanina wody i etanolu (47:1), kwas benzoesowy. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, kwas benzoesowy. Produkt leczniczy zawiera 4,2 g sacharozy i 6,55 kwasu benzoesowego w 5 ml syropu. Zawartość etanolu (760g/l) w produkcie wynosi nie więcej niż 1,1% (m/v). **Postać farmaceutyczna:** Syrop. **Wskazania do stosowania:** Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia podrażnień błony śluzowej górnych dróg oddechowych z towarzyszącym suchym kaszlem. **Dawkowanie i sposób podawania:** Dawkowanie: *Dorośli i młodzież powyżej 12 lat* - trzy razy na dobę po 15 ml. *Dzieci w wieku 6-12 lat* - zazwyczaj cztery razy na dobę po 5 ml. *Dzieci w wieku 3-6 lat* - zazwyczaj cztery razy na dobę po 2,5 ml. *Dzieci poniżej 3 lat:* Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci poniżej 3 lat bez konsultacji z lekarzem. Jeśli objawy chorobowe utrzymują się dłużej niż tydzień, podczas stosowania produktu leczniczego, należy skontaktować się z lekarzem. Sposób podawania: Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** Jeśli dolegliwości nasiliły się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem. W razie wystąpienia duszności, gorączki lub ropnej płwociny należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Syrop prawoślazowy może opóźniać wchłanianie niektórych leków, dlatego zaleca się zachowanie pół do 1 godziny odstępu podczas przyjmowania innych produktów leczniczych. Produkt leczniczy zawiera 6,55 mg kwasu benzoesowego w 5 ml syropu. Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego nie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową. Produkt leczniczy zawiera 4,2 g sacharozy w 5 ml syropu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Produkt zawiera 1,1% m/v etanolu (alkoholu) tzn. do 186 mg na dawkę 15 ml, co jest równoważne 4,7 ml piwa, 2 ml wina na dawkę. Ze względu na zawartość alkoholu nie zaleca się podawania pacjentom z chorobami wątroby, padaczką oraz chorobą alkoholową. **Działania niepożądane:** Działania niepożądane nie są znane. **Podmiot odpowiedzialny:** PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. **Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:** IL-0692/LN. **Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.
- 2. SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY (0,945 g + 0,63 mg)/5 ml, syrop. Skład:** 100 g syropu sporządzonego wg receptury FP zawiera: wyciąg tymiankowy płynny (*Thymi extractum fluidum* DER 1:3) - 15,0 g; tymol (*Thymolum*) - 0,01 g. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: etanol, sacharoza. Produkt zawiera 7,9% (V/V) etanolu. **Postać farmaceutyczna:** Syrop. **Wskazania do stosowania:** Kaszel z trudnością w odkrztuszaniu lepkiej wydzieliny, tzw. kaszel mokry. **Dawkowanie i sposób podawania:** Dawkowanie: *Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:* 10 ml syropu 3 razy na dobę. *Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:* 5 ml syropu 3 razy na dobę. W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów. Sposób podawania: Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka. **Przeciwwskazania:** Uczulenie na substancje

czynne, rośliny z rodziny jasnowatych (wargowych) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** Jeśli podczas stosowania syropu objawy nasiliły się, utrzymują się dłużej niż 7 dni, lub jeśli pojawi się duszność, gorączka lub ropna płwocina należy skontaktować się z lekarzem. Jednorazowa dawka syropu dla dorosłych (10 ml) zawiera 7,2 g sacharozy. Jednorazowa dawka syropu dla dzieci (5 ml) zawiera 3,6 g sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. W przypadku wcześniejszego stwierdzenia nietolerancji niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem. Syrop zawiera 7,9 % (v/v) etanolu (alkohol), tzn. do 0,6 g etanolu na dawkę, co jest równoważne 15,8 ml piwa i 6,6 ml wina na maksymalną dawkę jednorazową. Zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z chorobą wątroby lub z padaczką. Lek może być szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. **Działania niepożądane:** Mogą wystąpić dolegliwości żołądkowe (częstość nie jest znana). W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano reakcje nadwrażliwości. **Podmiot odpowiedzialny:** PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. **Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:** IL-0995/LN. **Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

3. **SYROP Z BABKI LANCETOWATEJ I JEŻÓWKI, (642,5 mg + 160,6 mg)/5 ml, syrop. Skład:** 100 g syropu zawiera: 10,0 g wyciągu płynnego z liści babki lancetowatej *Plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum* (DER 1:3), ekstrahent: etanol 60% (V/V); 2,5 g wyciągu gęstego z jeżówki *Echinaceae purpureae extractum spissum* (DER 5-7:1), ekstrahent: etanol 60% (V/V). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza. 5 ml syropu zawiera 3,75 g sacharozy. Produkt zawiera 8% (m/m) etanolu. 5 ml syropu zawiera ok. 0,51 g etanolu. **Postać farmaceutyczna:** Syrop. **Wskazania do stosowania:** Pomocniczo w przeziębieniach i stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. **Dawkowanie i sposób podawania:** Dawkowanie: *Dorośli:* 15 ml syropu od 3 do 5 razy na dobę. *Dzieci w wieku powyżej 6 lat:* 5 ml syropu 3 razy na dobę. Sposób podawania: Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka. Terapia powinna trwać nie dłużej niż 7 dni. Jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się, należy skonsultować się z lekarzem. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancje czynne, a szczególnie na rośliny z rodziny babkowatych (*Plantaginaceae*) i astrowatych (*Asteraceae*) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** Produkt zawiera sacharozę (3,75 g/ 5 ml syropu), dlatego nie powinien być stosowany u chorych na cukrzycę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Produkt zawiera 8% (m/m) etanolu - w 5 ml syropu znajduje się 0,51 g etanolu; w 15 ml syropu znajduje się 1,53 g etanolu. 5 ml syropu zawiera etanol w ilości odpowiadającej około 5,4 ml wina o zawartości 12% (V/V) alkoholu lub około 13 ml piwa o zawartości 5% (V/V) alkoholu. 15 ml syropu zawiera etanol w ilości odpowiadającej około 16,2 ml wina o zawartości 12% (V/V) alkoholu lub około 39 ml piwa o zawartości 5% (V/V) alkoholu. Produkt może być szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową, osób z chorobami wątroby lub z padaczką oraz dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. **Działania niepożądane:** Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. U osób z atopią mogą wystąpić nasilone reakcje alergiczne. **Podmiot odpowiedzialny:** „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. **Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:** 7690. **Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

4. **Syrop z babki lancetowatej, 647 mg/5 ml, syrop. Skład jakościowy i ilościowy:** 100 g syropu zawiera: 10 g wyciągu płynnego (1:3) z *Plantago lanceolata* L., folium (liść babki lancetowatej), ekstrahent: etanol 60% (V/V). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza. 5 ml syropu zawiera 3,9 g sacharozy. Produkt zawiera nie więcej niż 5,5% (m/m) etanolu. **Postać farmaceutyczna:** Syrop. **Wskazania do stosowania:** Produkt tradycyjnie stosowany w nieżytach górnych dróg oddechowych i w przeziębieniu. Pomocniczo w podrażnieniu jamy ustnej i gardła oraz towarzyszącym suchym kaszlu. **Dawkowanie i sposób podawania:** Dawkowanie: *Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:* po 5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę. *Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:* po 15 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, zaleca się wdrożenie innego leczenia. Sposób podawania: Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** Jeśli podczas stosowania leku pojawi się duszność, gorączka lub ropna plwocina należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt zawiera nie więcej niż 5,5% (m/m) etanolu. 5 ml syropu zawiera etanol w ilości odpowiadającej około 3,8 ml wina o zawartości 12% (V/V) alkoholu lub około 9,1 ml piwa o zawartości 5% (V/V) alkoholu. 15 ml syropu zawiera etanol w ilości odpowiadającej około 11,4 ml wina o zawartości 12% (V/V) alkoholu lub około 27,3 ml piwa o zawartości 5% (V/V) alkoholu. Obecność etanolu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania produktu u dzieci i osób ze schorzeniami wątroby lub padaczką. Nie należy stosować produktu u osób z chorobą alkoholową. Produkt zawiera sacharozę. 5 ml syropu zawiera 3,9 g sacharozy, a 15 ml zawiera 11,7 g sacharozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. **Działania niepożądane:** Nie zgłoszono przypadków wystąpienia objawów działań niepożądanych po podaniu produktu leczniczego. Znane są przypadki osobniczej nadwrażliwości na składniki zawarte w babce lancetowatej. **Podmiot odpowiedzialny:** PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. **Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:** R/2954. **Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.
5. **SYROP Z CEBULI, 949 mg/5 ml, syrop. Skład jakościowy i ilościowy:** 100 g syropu zawiera: 15 g wyciągu płynnego z *Allium cepa* L., bulbus (bulwa cebuli), DER 1:6, ekstrahent: etanol 70% (V/V). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza. Produkt zawiera 7 do 10% (m/m) etanolu. 5 ml syropu zawiera 3,67 g sacharozy. **Postać farmaceutyczna:** Syrop. **Wskazania do stosowania:** Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (przeziębienie, katar). **Dawkowanie i sposób podawania:** Dawkowanie: *Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:* 15 ml syropu 3 razy na dobę. *Dzieci od 6 lat:* 5 ml syropu 3 razy na dobę. Sposób podawania: Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** Produkt zawiera do 10% (m/m) etanolu. Dawka jednorazowa dla dzieci od 6 lat (5 ml) zawiera etanol w ilości odpowiadającej do 6,7 ml wina o zawartości 12 % (V/V) alkoholu lub do 16,1 ml piwa o zawartości 5% (V/V) alkoholu. Dawka jednorazowa dla dorosłych i młodzieży (15 ml) zawiera etanol w ilości odpowiadającej do 20,1 ml wina o zawartości 12 % (V/V) alkoholu lub do 48,3 ml piwa o zawartości 5% (V/V) alkoholu. Obecność etanolu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u dzieci i osób ze schorzeniami wątroby lub padaczką. Nie należy stosować

produktu u osób z chorobą alkoholową. Produkt zawiera sacharozę. 5 ml syropu zawiera 3,67 g sacharozy, a 15 ml zawiera 11 g sacharozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego. **Działania niepożądane:** Nie zgłoszono przypadków wystąpienia objawów działań niepożądanych po podaniu produktu leczniczego. Znane są przypadki osobniczej nadwrażliwości na składniki zawarte w cebuli. **Podmiot odpowiedzialny:** PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. **Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:** R/2009. **Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

6. **SYROP Z DZIEWANNY, 952 mg/5 ml, syrop. Skład:** 100 g syropu zawiera: 15 g wyciągu płynnego (1:5) z *Verbascum* spp., flos (kwiat dziewanny) (*Verbasci flos extractum fluidum*), rozpuszczalnik: etanol 60% (V/V). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza. Produkt zawiera do 7,9% (wag.) etanolu. 5 ml syropu zawiera do 0,5 g etanolu. 5 ml syropu zawiera 3,7 g sacharozy. **Postać farmaceutyczna:** Syrop. **Wskazania do stosowania:** Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia objawów bólu gardła towarzyszących suchemu kaszlowi i przeziębieniu. **Dawkowanie i sposób podawania:** Dawkowanie: *Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:* 15 ml syropu 3-4 razy na dobę. Nie należy stosować produktu dłużej niż tydzień. *Dzieci:* Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania. Sposób podawania: Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na zawartość sacharozy produkt nie jest przeznaczony dla osób chorych na cukrzycę. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** W przypadku wystąpienia duszności, gorączki i (lub) ropnej płwociny należy skonsultować się z lekarzem. Produkt zawiera ok. 12,7% (V/V) etanolu. 15 ml syropu zawiera alkohol w ilości odpowiadającej ok. 38 ml piwa o zawartości etanolu 5% (V/V) lub ok. 16 ml wina o zawartości etanolu 12% (V/V), co należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u dzieci i osób ze schorzeniami wątroby lub padaczką. Nie należy stosować produktu u osób z chorobą alkoholową. Produkt zawiera sacharozę. 15 ml syropu zawiera 11,1 g sacharozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Dzieci: Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania. **Działania niepożądane:** Nie są znane. **Podmiot odpowiedzialny:** PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. **Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:** R/7015. **Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.
7. **Syrop z lipy, bzu czarnego, wierzby i dziewanny, syrop. Skład:** 100 g syropu zawiera: 10 g wyciągu płynnego (1:1,46) z: *Verbascum* spp., flos (kwiatu dziewanny)/ *Tilia* spp., flos (kwiatu lipy)/ *Salix* spp., cortex (kory wierzby)/ *Sambucus nigra* L., flos (kwiatu bzu czarnego)(2,5/3,0/1,5/3,0). Ekstrahent: etanol 60 % (V/V). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza (3,9 g w 5 ml syropu). Zawartość etanolu w produkcie nie więcej niż 5,1% (m/m). **Postać farmaceutyczna:** Syrop. **Wskazania do stosowania:** Produkt leczniczy roślinny przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Syrop z lipy, bzu czarnego,

wierzby i dziewanny stosuje się tradycyjnie jako łagodny środek napotny w niewysokiej gorączce występującej w przebiegu przeziębienia. Pomocniczo w przebiegu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych przebiegających z kaszlem, gorączką, bólem gardła. **Dawkowanie i sposób podawania:** Dawkowanie: *Dzieci w wieku powyżej 3 lat:* 2,5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę. *Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat:* 5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę. Należy zachować przynajmniej 4 godzinną przerwę pomiędzy dawkami. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Jeśli po 3 dniach nie nastąpi poprawa lub objawy się utrzymują, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem. Sposób podania: Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na salicylany i inne NLPZ, astma, choroba wrzodowa, ciężkie zaburzenia funkcji nerek i wątroby, zaburzenia krzepnięcia, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej. Ze względu na zawartość kory wierzby nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 3 lat. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** Nie należy przekraczać zalecanych dawek produktu leczniczego. Jeśli gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, przekroczy 39°C, towarzyszy jej silny ból głowy lub objawy nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem. Ze względu na zawartość etanolu na dawkę (0,3 g/5 ml), odpowiadającą około 3,2 ml wina lub 7,6 ml piwa, produkt może być szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową, chorobą wątroby lub z padaczką, a także dla kobiet ciężarnych oraz karmiących piersią. Lek zawiera 3,9 g sacharozy w 5 ml. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. **Działania niepożądane:** Podczas stosowania zalecanych dawek nie obserwowano występowania działań niepożądanych. Dla kwiatów lipy opisano pojedynczy przypadek zawodowego uczulenia kontaktowego. Dla kory wierzby znane są odczyny uczuleniowe takie jak wysypki, pokrzywka, duszność, objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, niestrawność, zgaga) o nieznanym częstości występowania. **Podmiot odpowiedzialny:** PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. **Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:** R/0754. **Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

8. **SYROP Z SOSNY I KOPRU WŁOSKIEGO ZIOŁOWA TRADYCJA, syrop. Skład:** 100 g produktu zawiera: wyciąg płynny z pędów sosny (*Pini turiones extractum fluidum*) (1:4) - 6,60 g, ekstrahent: etanol 85% V/V; nalewka z owocu kopru włoskiego (*Foeniculi tincture*) (3:7,4-7,8) - 1,00 g, ekstrahent: etanol 70% V/V; wapnia mleczan pięciowodny (*Calcii lactas pentahydricus*) - 1,00 g. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: etanol, sacharoza. Produkt zawiera nie więcej niż 5,6% m/m tj. 9,1% V/V etanolu. 5 ml syropu zawiera 3 g sacharozy. 5 ml syropu zawiera do 0,4 g etanolu. **Postać farmaceutyczna:** Syrop. **Wskazania do stosowania:** Pomocniczo w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z kaszlem i gęstą wydzieliną (tzw. kaszel mokry). **Dawkowanie i sposób podawania:** Dawkowanie: *Dorośli:* 15 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę. *Dzieci i młodzież:* Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę. U dzieci od 4 do 6 lat stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Lekarz ustala dawkowanie. Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 4 lat ze względu na zawartość etanolu oraz brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania. Sposób podawania: Podanie doustne. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancje czynne, na inne rośliny z rodziny

selerowatych (*Apiaceae*, dawniej *Umbelliferae*) jak anyż, kminek, seler, kolendra, koper ogrodowy lub na anetol, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować w astmie oskrzelowej, ostrej niewydolności oddechowej. Nie stosować u pacjentów z chorobą wątroby.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Produkt leczniczy zawiera 9,1% V/V etanolu. Dawka dla dzieci od 6 lat (5 ml) zawiera do 0,4 g etanolu, co jest równoważne 9,1 ml piwa i 3,8 ml wina. Dawka dla dorosłych (15 ml) zawiera do 1,2 g etanolu, co jest równoważne 27,3 ml piwa i 11,4 ml wina. Produkt szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Obecność etanolu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u dzieci i osób wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego z uwagi na obecność sacharozy jako substancji pomocniczej. 5 ml syropu zawiera 3 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Działania niepożądane: Mogą wystąpić reakcje alergiczne dotyczące skóry lub układu oddechowego. Częstość nieznana.

Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 7890.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.